

**I. Définition d'une solution**

Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$  et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ . On s'intéresse à l'équation différentielle

$$y' = f(t, y), \quad (t, y) \in \Omega, t \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^N. \quad (\mathcal{E})$$

*Définition 1, Solution :* Une solution de  $(\mathcal{E})$  sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  est une fonction dérivable  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  telle que (i)  $\forall t \in I, (t, y(t)) \in \Omega$  et (ii)  $\forall t \in I, y'(t) = f(t, y(t))$ .

*Lemme, Formulation intégrale :* Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ . Une fonction  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  est une solution de  $(\mathcal{E})$  telle que  $y(t_0) = y_0$  si et seulement si (i)  $y$  est continue, (ii)  $\forall t \in I, (t, y(t)) \in \Omega$  et (iii)  $\forall t \in I, y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ .

*Définition 2, Prolongement :* Soient  $y_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^N$  et  $y_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^N$  deux solutions de  $(\mathcal{E})$ . On dit que  $y_2$  est un prolongement de  $y_1$  si  $I_1 \subset I_2$  et  $y_2|_{I_1} = y_1$ .

*Définition 3, Solution maximale :* On dit que  $y$  est une solution maximale si elle n'admet pas d'autre prolongement qu'elle-même.

**Exercice 1 (Exemples et contre-exemples de solutions)**

Résoudre  $y' = 2y^{3/2}$  et  $y' = 3y^{2/3}$  en précisant l'intervalle maximal d'existence.

**Exercice 2 (Comparaison de solutions)**

Soient  $y$  et  $z$  dérivables sur  $[0, T]$  et telles que  $y'(t) = f(t, y(t))$  et  $z'(t) < f(t, z(t))$  pour tout  $t \in [0, T]$ . On suppose que  $z(0) < y(0)$ . Montrer que pour tout  $t \in [0, T]$ , on a  $z(t) < y(t)$ .

**Exercice 3 (Régularité des solutions)**

Montrer que si  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  est de classe  $C^k$ , alors toute solution de  $(\mathcal{E})$  est de classe  $C^{k+1}$ .

**II. Les théorèmes d'existence**

*Définition 4, Localement lipschitzien par rapport à la seconde variable :* Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ .  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  est dite localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable (ici  $y$ ) si  $\forall (\tilde{t}, \tilde{y}) \in \Omega$ , il existe  $C_0 = [\tilde{t} - T, \tilde{t} + T] \times \overline{B}(\tilde{y}, r) \subset \Omega$  avec  $T, r > 0$  et  $k \geq 0$  tels que  $\forall (t, y_1), (t, y_2) \in C_0, \|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq k \|y_1 - y_2\|$ .

*Théorème de Cauchy-Lipschitz :* Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$  et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  continue (dans toutes les variables) et localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable (ici  $y$ ). Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ . Alors il existe une solution maximale et une seule  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  de  $(\mathcal{E})$  telle que  $y(t_0) = y_0$ . De plus, l'intervalle  $I$  est ouvert.

*Théorème de Cauchy-Péano :* Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$  et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  continue. Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ . Alors il existe une solution maximale  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  de  $(\mathcal{E})$  telle que  $y(t_0) = y_0$ . De plus, l'intervalle  $I$  est ouvert.

**Exercice 4 [Cours, Dvlpt] (Cauchy-Lipschitz dans la cas globalement lipschitzien)**

1) Rappel: un théorème de point fixe. Soit  $(E, d)$  un espace métrique complet. Soit  $f : E \rightarrow E$  telle que  $d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y) \quad \forall x, y \in E$ , où  $k \in [0, 1[$  ( $f$  est contractante).

a) Soient  $x_0 \in E$  et  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite réelle définie par  $x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N}^*$ . Montrez que  $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$  et en déduire que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est de Cauchy.

b) Montrez qu'il existe  $x \in E$  tel que  $x = f(x)$  et que ce point fixe est unique.

c) Montrez que ces résultats (existence et unicité du point fixe) restent vrais si l'on remplace  $f$  contractante par l'existence d'une itérée  $f^K$  de  $f$  (avec  $K \in \mathbb{N}^*$ ) qui soit contractante.

2) Application aux équations différentielles. On se place dans le cas de  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  une application continue telle que  $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq k \|x - y\|, \forall x, y \in \mathbb{R}^N, t \in \mathbb{R}$  où  $k \in \mathbb{R}$ .

a) Notons  $E$  l'espace  $C^0([0, T], \mathbb{R}^n)$  muni de la norme  $\|y\|_E = \sup_{t \in [0, T]} \|y(t)\|_{\mathbb{R}^n}$ . Montrez que l'application  $\Phi$  qui à tout élément  $y$  de  $E$  associe la fonction  $\Phi(y)$  de  $[0, T]$  dans  $\mathbb{R}^n$  définie par  $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds$  est une application continue de  $E$  dans lui-même.

b) Soient  $y, \tilde{y} \in E$ . Démontrez l'inégalité  $\|\Phi^p(y)(t) - \Phi^p(\tilde{y})(t)\|_E \leq k^p \frac{t^p}{p!} \|y - \tilde{y}\|_E, \forall t \in [0, T]$ .

c) En déduire que le problème  $(\mathcal{E})$  avec la condition  $y(0) = y_0$  admet une unique solution sur  $[0, T]$ .

### Exercice 5 [Cours, Dvlpt] (Cylindres de sécurité et Cauchy-Lipschitz local)

Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$  et  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  continue.

*Définition 5, Cylindre de sécurité :* On dit que  $C = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times \overline{B}(y_0, r_0) \subset \Omega$ , avec  $\alpha, r_0 > 0$ , est un cylindre de sécurité pour  $(\mathcal{E})$  si toute solution  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  telle que  $y(t_0) = y_0$  (avec  $I \subset [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ ) reste contenue dans  $\overline{B}(y_0, r_0)$ .

1) Soient  $T_0, r_0 > 0$ . Montrer que pour tout  $(t_0, y_0) \in \Omega$  et pour tout cylindre  $C_0 = [t_0 - T_0, t_0 + T_0] \times \overline{B}(y_0, r_0) \subset \Omega$ , il existe un cylindre de sécurité  $C = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times \overline{B}(y_0, r_0) \subset C_0$ .

2) On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable. Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ . Obtenir  $\alpha > 0$  et  $r_0 > 0$  afin que pour tout  $y \in E = C^0([t_0 - \alpha, t_0 + \alpha], \overline{B}(y_0, r_0))$ ,  $\Phi(y)$  de  $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$  dans  $\mathbb{R}^n$  définie par  $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds$  est dans  $E$ .

3) S'inspirer de la preuve de l'exercice précédant pour conclure à l'existence d'une solution sur  $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ .

### Exercice 6 [Cours] (Démonstration de Cauchy-Péano local)

On a besoin pour prouver ce résultat des deux énoncés suivants :

*Théorème de Schauder :* Soit  $\Phi : K \rightarrow K$  continue où  $K$  est fermée convexe de  $E$  espace métrique complet avec  $\Phi(K)$  relativement compact dans  $E$ . Alors  $\Phi$  admet au moins un point fixe dans  $K$ .

*Théorème d'Ascoli :* Soit  $L$  un espace métrique compact,  $Y$  un espace métrique et  $\mathcal{H}$  un sous-ensemble borné de  $C^0(L, Y)$ . On suppose que  $\mathcal{H}$  est uniformément équicontinue, c'est-à-dire que  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  tel que  $d(x, x') < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x')) < \varepsilon$ . Alors  $\mathcal{H}$  est relativement compacte dans  $C^0(L, Y)$ .

On suppose que les hypothèses de Cauchy-Péano sont vérifiées. Il existe  $T > 0$  et  $r > 0$  tels que  $C_0 = [t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{B}(y_0, r) \subset \Omega$ . Montrer qu'il existe  $0 < \alpha \leq T$  tel que si on définit sur  $E = C^0([t_0 - \alpha, t_0 + \alpha], \overline{B}(y_0, r))$  l'application  $\Phi(y)$  par  $\Phi(y)(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds$ , alors  $\Phi$  a un point fixe dans  $E$  et conclure que  $(\mathcal{E})$  a une solution telle que  $y(t_0) = y_0$  sur  $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ .

### Exercice 7 [Cours] (Prolongements pour obtenir les théorèmes globaux)

1) Sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, montrer que si  $y$  et  $\tilde{y}$  sont deux solutions de  $(\mathcal{E})$  de  $I$  dans  $\mathbb{R}^N$  qui coïncident en un point de  $I$  alors elles coïncident sur tout  $I$ .

2) Toujours sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, on pose  $\mathcal{F} = \{I \text{ intervalle}; t_0 \in I \text{ et } (\mathcal{E}) \text{ a une solution sur } I \text{ qui vaut } y_0 \text{ en } t_0\}$ . Pourquoi  $\mathcal{F}$  est-il bien définie et non vide ? Construire une solution maximale et conclure au théorème de Cauchy-Lipschitz.

3) Sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Péano, par le théorème de Cauchy-Péano local, on a l'existence d'une solution sur  $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ . Supposons que la solution est définie sur  $I = ]a, b[$  intervalle ouvert ou fermé. Montrons qu'alors on peut la prolonger à droite en  $\tilde{y} : ]a, \tilde{b}] \rightarrow \mathbb{R}^N$  maximale à droite.

a) On construit pour cela par récurrence des prolongements successifs  $y^{(k)} : ]a, b_k] \rightarrow \mathbb{R}^N$ . Pour  $k = 1$ , on prend  $y^{(1)} = y, b_1 = b$  ; puis pour  $k \geq 1$ , si on suppose que  $y^{(k)}$  est construit, on pose  $c_{k+1} = \sup\{c; y^{(k)} \text{ se prolonge sur } [a, c]\}$  (ensemble non vide ?) et on a  $b_k \leq c_{k+1}$  (le montrer). Il existe alors  $b_{k+1}$  tel que  $b_k \leq b_{k+1} \leq c_{k+1}$  et tel que  $y^{(k)}$  se prolonge sur  $[a, b_{k+1}[$  en  $y^{(k+1)}$  avec  $c_{k+1} - b_{k+1} < 1/(k+1)$  pour  $c_{k+1} < +\infty$  et  $b_{k+1} > k+1$  sinon.

b) Montrer que  $c_{k+1} \leq c_k$  et que les suites  $(b_k)$  et  $(c_k)$  sont convergentes vers la même limite.

c) En déduire un prolongement maximal à droite.

d) On procède de même à gauche et pour conclure, montrer que l'intervalle d'existence de la solution maximale est ouvert.

### Exercice 8 (Résolution d'une équation différentielle)

On cherche à résoudre  $(\mathcal{E}) : xy'' + 2y' + \omega^2xy = 0$ .

1) Par la technique du développement en série entière, obtenir une solution que l'on notera  $y_1$ .

2) On pose  $y(x) = \lambda(x)y_1(x)$ . Quelle équation différentielle vérifie  $\lambda$  ? La résoudre et en déduire les solutions de  $(\mathcal{E})$ .

### Exercice 9 (Calcul d'une intégrale généralisé à paramètre)

On cherche à calculer  $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx-t^2} dt$ .

1) Montrer que  $\Phi$  est définie et  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

2) Montrer que  $\Phi$  est solution de  $y + xy' - 2y'' = 0$  avec les conditions  $y(0) = \sqrt{\pi}$ ,  $y'(0) = 0$ .

3) Résoudre cette équation et conclure à la valeur de  $\Phi$ .

### Exercice 10 (Contre-exemple en dimension infinie)

Le théorème de Cauchy-Lipschitz reste vrai dans un espace de dimension infinie ce qui n'est pas le cas du théorème de Cauchy-Péano. En voici un exemple.

Soit  $c_0$  l'espace de Banach des suites réelles qui tendent vers 0 muni de la norme  $\|x\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$ .

On définit  $f$  de  $c_0$  dans  $c_0$  selon  $f(y)_n = \sqrt{|y_n|} + \frac{1}{n+1}$ . Montrer que  $f$  est continue sur  $c_0$  mais que  $y' = f(y)$  avec la condition  $y(0) = 0$  n'a pas de solution  $y$  dans  $C^1([0, T], c_0)$ .

## III. Lemme de Gronwall

*Lemme de Gronwall* : Soit  $a$  une fonction de classe  $C^1$  sur  $[0, T]$  et  $u, v$  des fonctions continues sur  $[0, T]$  avec  $v \geq 0$ . On suppose que  $u(t) \leq a(t) + \int_0^t u(s)v(s) ds$ . Alors  $u(t) \leq \sup_{0 \leq s \leq t} |a(s)| e^{\int_0^t v(s) ds}$ .

### Exercice 11 [Cours] (Lemme de Gronwall)

Montrez-le ! (On pourra commencer par le cas où  $a$  est constante.)

### Exercice 12 (Une application de Gronwall)

En déduire que pour  $q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$ ,  $> 0$  et croissante, toute solution de  $y'' + q(t)y = 0$  est bornée sur  $\mathbb{R}^+$ .

### Exercice 13 (Inégalité de stabilité)

1) Soit  $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$  de classe  $C^1$  telle que  $\|u'(t)\| \leq L\|u(t)\| + M$ .

Montrer que  $\|u(t)\| \leq \|u(t_0)\| e^{L|t-t_0|} + \frac{M}{L}(e^{L|t-t_0|} - 1)$ .

2) Soit  $y$  une solution de  $y' = f(t, y)$  telle que  $y(t_0) = y_0$  et  $\tilde{y}$  une solution de  $\tilde{y}' = \tilde{f}(t, \tilde{y})$  telle que  $\tilde{y}(t_0) = \tilde{y}_0$ . On suppose que  $\|f(t, x) - \tilde{f}(t, x)\| \leq M$  et  $\|f(t, x) - f(t, \tilde{x})\| \leq L\|x - \tilde{x}\|$ . Obtenir une estimation de la différence entre  $y$  et  $\tilde{y}$ .

*Remarque* : Ceci permet de voir que de petites variations sur la vitesse initiale et le champ de force entraîne de petites variations sur la trajectoire du point.

## IV. Théorème des bouts

*Théorème des bouts* : Soit  $\Omega = ]a, b[ \times \Omega'$  avec  $\Omega'$  un ouvert de  $\mathbb{R}^N$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  continue et localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable (ici  $y$ ). Soit  $y : ]c, d[ \rightarrow \mathbb{R}^N$  une solution maximale avec  $d < b$ . Alors pour tout compact  $K \subset \Omega'$ , il existe un voisinage  $V$  de  $d$  tel que  $y(t) \notin K$  pour tout  $t \in V$ . (C'est-à-dire que  $t \mapsto y(t)$  sort de tout compact de  $\Omega'$  lorsque  $t \rightarrow d$ ).

### Exercice 14 [Cours] (Théorème des bouts)

1) On commence par affiner le résultat sur les cylindres de sécurité. On se place dans le cadre d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz. Montrer que pour tout  $(t_0, y_0) \in \Omega$ , il existe un cylindre de sécurité  $C = [t_0 - \beta, t_0 + \beta] \times \overline{B}(y_0, r_1) \subset \Omega$ , avec  $\beta, r_1 > 0$ , tel que pour tout  $(\tilde{t}_0, \tilde{y}_0) \in C$ , il existe une solution de  $(\mathcal{E})$  telle que  $y(\tilde{t}_0) = \tilde{y}_0$  définie sur  $[t_0 - \beta, t_0 + \beta]$ .

2) On cherche maintenant à montrer le théorème des bouts. Par l'absurde on suppose qu'il existe un compact  $K \subset \Omega'$  et une suite  $t_n \rightarrow d$  telle que  $y(t_n) \in K$  pour tout  $n$ . Construire une solution qui prolonge strictement la solution maximale pour aboutir à la contradiction.

3) Ecrire l'énoncé dans le cas où  $\Omega' = \mathbb{R}^N$ .

### Exercice 15 (Solutions globales)

*Définition 6, Solution globale :* Dans le cas où  $\Omega = I \times \Omega'$  avec  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $\Omega'$  un ouvert de  $\mathbb{R}^N$ , une solution globale est une solution définie sur  $I$  tout entier.

1) Soit  $]a, b[$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Soit  $f : ]a, b[ \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$  continue et bornée. Montrer que toute solution maximale est globale.

2) Montrer que c'est encore vrai si on remplace l'hypothèse  $f$  bornée par l'existence de deux constantes  $C_1$  et  $C_2$  telles que  $\|f(t, x)\| \leq C_1\|x\| + C_2$  pour tout  $(t, x) \in ]a, b[ \times \mathbb{R}^N$ .

## V. Deux classes d'équations

### Exercice 16 (Equation autonome)

Une équation autonome est une équation  $(\mathcal{A})$  de la forme  $y' = f(y)$  avec  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$  localement lipschitzienne et  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^N$ .

1) Soit  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  et  $\tilde{y} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^N$  deux solutions maximales de  $(\mathcal{A})$  telles qu'il existe  $t_0 \in I$  et  $t_1 \in \tilde{I}$  tels que  $y(t_0) = \tilde{y}(t_1)$ . Montrer qu'alors  $\{y(t); t \in I\} = \{\tilde{y}(t); t \in \tilde{I}\}$ .

2) Soit  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^N$  une solution maximale de  $(\mathcal{A})$ . Montrer que s'il existe  $t_2 > t_1$  tels que  $y(t_1) = y(t_2)$ , alors  $y$  admet un prolongement périodique à  $\mathbb{R}$  tout entier.

3) On suppose que  $N = 1$  et que  $f$  est de classe  $C^1$ ,  $f > 0$  et telle que  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{f(s)} ds < +\infty$ .

a) Montrer que  $G(s) = \int_{y_0}^s \frac{1}{f(\sigma)} d\sigma$  est une bijection de  $[y_0, +\infty[$  sur  $[0, \int_{y_0}^{+\infty} \frac{1}{f(s)} ds[$ .

b) En déduire que la solution maximale  $y$  telle que  $y(t_0) = y_0$  est définie sur  $]T_*, T^*[$  avec  $T^* = t_0 + \int_{y_0}^{+\infty} \frac{1}{f(s)} ds$ .

c) Montrer de même que  $T_* = t_0 - \int_{-\infty}^{y_0} \frac{1}{f(s)} ds$ .

### Exercice 17 (Equation de Newton)

Une équation de Newton est une équation de la forme  $y'' = f(y)$  avec  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  localement lipschitzienne et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Ici, on s'intéressera au cas particulier de  $(\mathcal{N}) : y'' + 2y^3 = 0$ .

1) Montrer l'existence d'une intégrale première pour  $(\mathcal{N})$ , c'est-à-dire d'une application  $E$  telle que  $\frac{d}{dx}(E(y(x))) = 0$  pour toute solution de  $(\mathcal{N})$ . En déduire que toutes les solutions maximales sont globales.

2) Soit  $y$  une solution maximale de  $(\mathcal{N})$ .

a) Montrer que les zéros de  $y$  sont isolés et que  $y$  s'annule au moins une fois.

b) Montrer que  $y$  ne possède pas de plus grand zéro.

c) Montrer que  $y$  est périodique.

### Bibliographie :

- Demailly, Analyse numérique et équations différentielles (référence principale + ex 3 et 7)
- Gourdon (ex 12 et 4)
- Leichtman, Schauer, tome 4 (ex 2, 8, 9 et 13)
- Pommellet (ex 16 et 17)
- Zuily, Queffélec (ex 1, 10, 15 et 16)