

Mathématiques L3 - 2007/2008
T.D. d'analyse Numérique
 Feuille n4

Exercice 1 On veut appliquer la méthode de Newton à un polynôme f . On suppose qu'il existe y tq $f(y) = 0$ et que y est une racine d'ordre l , *i.e.*

$$f(y) = f'(y) = \dots = f^{l-1}(y) = 0 \quad \text{mais} \quad f^l(y) \neq 0.$$

1) Montrer que l'on peut définir l'application S_f de façon continue et dérivable sur un voisinage de y même si $l > 1$ et que l'on a toujours $S_f(y) = y$.

2) Prouver que $S'_f(y) = 1 - 1/l$.

3) En déduire qu'il existe $\eta > 0$ et $\mu < 1$ tel que si $|x - y| < \eta$ alors $|S_f(x) - y| < \mu |x - y|$.

4) Pour x_0 tq $|x_0 - y| < \eta$, conclure que

$$|x_k - y| \leq \eta \mu^k.$$

Exercice 2 Soit $f \in C(I, \mathbb{R})$ avec $I = [a, b]$ et $f(a) < 0$, $f(b) > 0$.

1) Estimer le nombre de fois (en fonction de ε) où l'on aura besoin de calculer une valeur de f pour approcher une racine à ε près.

2) On modifie la méthode dichotomie en divisant à chaque fois l'intervalle en trois parties au lieu de deux. Reprendre la question précédente dans ce cas et comparer les deux résultats.

Exercice 3 Soit $f(x) = \arctan x \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On cherche la racine $y = 0$ par la méthode de Newton. On définit donc

$$S_f(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

et on s'intéresse à la suite définie par

$$x_{n+1} = S_f(x_n).$$

1) Montrer que si

$$\arctan |x| > \frac{2|x|}{1+x^2},$$

alors $|S_f(x)| > |x|$.

2) Étudier la fonction $\phi(x) = (1+x^2) \arctan x - 2x$.

3) En déduire que si

$$\arctan |x| > \frac{2|x|}{1+x^2},$$

alors

$$\arctan |S_f(x)| > \frac{2|S_f(x)|}{1+(S_f(x))^2}.$$

4) On suppose que

$$\arctan |x_0| > \frac{2|x_0|}{1+x_0^2}.$$

Montrer qu'alors $|x_k|$ tend vers ∞ .